TRABAJOS LIBRES

SLEV

Sociedad Latinoamericana de
Endoscopia Veterinaria

01

CONGRESO
08 - 11
DICIEMBRE · 2026

SLEV · QUITO 2026 | **CONVOCATORIA DE TRABAJOS LIBRES**

UIDE Powered by · AMVEPE 30 AÑOS · C.E.I.Q. Cirugía Experimental e Investigación Quirúrgica

CONVOCATORIA ACADÉMICA

Convocatoria para la presentación de trabajos libres

Congreso Internacional dela Sociedad LatinoamericanadeEndoscopíaVeterinaria

8 al 11 de diciembre de 2026 · Quito, Ecuador

Comité Científico
SLEV 2026

300
PALABRAS DEL RESUMEN

10 + 5
MINUTOS · EXPOSICIÓN + PREGUNTAS

A TIPOS DE TRABAJO

1. Serie de casos (Al menos 5 casos)
2. Caso clínico (Menos de 5 casos)
3. Trabajos originales:
   - Abordajes quirúrgicos
   - Opciones terapéuticas
   - Conceptos anatómicos.

B ÁREAS TEMÁTICAS

1. Perros y gatos (Pequeños animales)
2. Pequeños mamíferos no convencionales
3. Aves o reptiles
4. Rumiantes
5. Equinos
6. Fauna silvestre o animales de zoológico

SLEV
Sociedad Latinoamericana de
Endoscopia Veterinaria

CONGRESO
08 - 11
DICIEMBRE · 2026

SLEV · QUITO 2026

BASES Y ENVÍO DE TRABAJOS

GUÍA DE PARTICIPACIÓN

Instrucciones para el envío de trabajos libres

Para la evaluación de las propuestas de trabajos libres, es necesario enviar un escrito de este en formato de resumen estructurado de acuerdo con los siguientes lineamientos:

01 FORMATO DEL DOCUMENTO

ARCHIVO
Word (Office)

TIPOGRAFÍA
Times New Roman 12

INTERLINEADO
1.5 líneas

HOJA Tamaño Carta **MÁRGENES** Derecho, arriba y abajo 2.5 cm, izquierdo 3 cm.

EXTENSIÓN Cuerpo del resumen de 300 palabras sin incluir título, autores e instituciones a las que pertenecen.

02 ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR

1. Tipo de trabajo.
2. Área temática.
3. Titulo corto en letras negritas.
4. Lista de autores e instituciones a las que pertenece, señalando con un asterisco al autor que presentara el trabajo.

03 APARTADOS SEGÚN TIPO DE TRABAJO

SERIE DE CASOS O NUEVAS PROPUESTAS
Introducción · Objetivo · Material y métodos · Resultados · Conclusión (opcional) · Una imagen (solo de ser indispensable).

CASO CLÍNICO
Introducción · Caso clínico (desarrollo del caso) · Conclusión (opcional) · Una imagen (solo de ser indispensable).

SLEV
Sociedad Latinoamericana de
Endoscopia Veterinaria

CONGRESO
08 - 11
DICIEMBRE · 2026

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Envío y aceptación de trabajos libres

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN

31 OCTUBRE 2026

ANTES DE LAS 00:00 HRS
Hora CDMX

El trabajo deberá de entregarse en el formato establecido vía correo electrónico.

01 CORREOS DE RECEPCIÓN FAVOR DE ENVIAR A AMBOS CORREOS

leyton.mvet@gmail.com

delangelvet@me.com

02 ASUNTO DEL CORREO

Trabajo libre SLEV 2026

03 NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN

La información sobre la aceptación de trabajos será realizada vía correo electrónico en la ultima semana de Octubre de 2026.

EJEMPLO 01

RESUMEN DE CASO CLÍNICO

CASO CLÍNICO

Área temática: Perros y gatos

Pearsonema plica en un perro

Mendoza-López CI[1*], Del-Angel-Caraza J[2], Quijano-Hernández IA[2]

1 Residente, 2 Académico. Hospital Veterinario para Pequeñas Especies FMVZ-UAEMex. Contacto: dlangel@uaemex.mx

INTRODUCCIÓN

La presencia de parásitos en el tracto urinario es poco frecuente y su hallazgo en exámenes endoscópicos escasamente descritos.

CASO CLÍNICO

Perro doméstico, hembra, mestizo de 8 años y con 3.5 kg. Fue remitido al hospital debido a nódulos de la glándula mamaria. En el examen físico, se detectaron los nódulos en diferentes pezones, sin evidencia de otros problemas clínicos; en la citología por aspiración con aguja fina, se obtuvieron datos de adenocarcinoma mamario. El paciente fue programado para mastectomía y ovariohisterectomía electiva por laparotomía; en los estudios prequirúrgicos no se encontraron cambios relevantes en el recuento sanguíneo y el perfil bioquímico, con tiempos de coagulación en rangos normales y una PU: CU 0,2; la orina se obtuvo por cistocentesis, la orina era de color amarillo claro, SG 1.020, sangre 1+, pH 6, negativa a la albúmina; en los sedimentos urinarios eritrocitos 8-10 / hpf, 400x y la presencia de un único huevo de Pearsonema plica con un cascaron muy delgado y extremos bipolares muy sutiles; morfología sugerente a estar en proceso de maduración. Con estos hallazgos y solo por la oportunidad de generar experiencia sobre esta patología, se realizó. Debido al tamaño del paciente, se realizó una cistoscopia anterógrada, logrando observar múltiples gusanos con diferentes niveles de actividad, en posición extendida o contraídos en espiral. algunos flotan sueltos en la orina y otros con una parte del cuerpo se inserta debajo de la mucosa de la vejiga urinaria (Figura), pero no fue posible ver los huevos del parásito.

CONCLUSIÓN

La cistoscopia es una herramienta útil para la evidencia de parásitos en las vías urinarias caudales.




Figura · Imagen endoscópica de *Pearsonema plica* en una hembra.

EJEMPLO 02

RESUMEN DE SERIE DE CASOS

SERIE DE CASOS

Área temática: Perros y gatos

Comparación entre dos métodos para la extracción de urolitos

Ake-Chiñas MA[1*], Del-Angel-Caraza J[2], Quijano-Hernández IA[2]Bolio-González M[3]

1 Residente, 2 Académico. Hospital Veterinario para Pequeñas Especies FMVZ-UAEMex; 3 Departamento de epidemiología, FMVZ, UADY.
Contacto: dlangel@uaemex.mx

INTRODUCCIÓN
La urolitiasis es una patología del tracto urinario caudal en los perros de México.

OBJETIVO
Evaluar el uso de la urohidropropulsión (UHP) y la cistolitotomía percutánea (CLP) para la extracción total de urolitos de las vías urinarias caudales en perros.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los dos diferentes procedimientos para la extracción de urolitos fueron utilizados a criterio del médico en pacientes con diagnóstico de urolitiasis, una vez terminado el procedimiento se realizaron estudios de imagen simples (radiográficos y ultrasonográficos) con la finalidad de evaluar la presencia de posibles urolitos remanentes, y los urolitos fueron analizados con la finalidad de analizar su composición mineral por medio de espectroscopia infrarroja.

RESULTADOS
Un total de 25 perros con urolitiasis fueron analizados, 10 hembras y 15 machos. En el caso de las hembras la UHP se realizó en 6 casos y la CLP en 4. En los machos 10 fueron sometidos a CLP y 5 a UHP. En los 14 casos sometidos a CLP se tuvo una tasa de éxito del 85.6% (12/14); y para los 11 con UHP del 81.8% (19/11). Los casos asociados con el fracaso para eliminar el total de urolitos fueron, en 2 machos y una hembra con urolitiasis de silicato y oxalato de calcio, con 1 a 2 urolitos de entre 2 y 3 mm, alojados en la uretra perineal.

CONCLUSIÓN
Tanto la UHP como la CLP son métodos de no invasivos o de mínima invasión útiles para la extracción total de urolitos en la mayoría de los casos de urolitiasis en perros.

EJEMPLO 03

RESUMEN DE NUEVAS PROPUESTAS

TRABAJO ORIGINAL

Área temática: Perros y gatos

Adrenalectomía retroperitoneal laparoscópica derecha, estudio cadavérico

Lillo F[1-2], Fuenzalida J[2], Rojas O[2], Lobato C[2], Aravena G[2], Venegas G[1], Lillo P[1].

[1]Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.
[2]Servicio de Cirugía Mínimamente Invasiva Veterinaria, Hospital Clínico Veterinario Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

Contacto: felipe.lillo@unab.cl

INTRODUCCIÓN
La adrenalectomía un impacto positivo en la terapia de TAF. La adrenalectomía laparoscópica se ha transformado en la alternativa terapéutica de elección en países del primer mundo. El abordaje retroperitoneal de la glándula es útil en humanos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta este estudio piloto cadavérico para establecer la factibilidad del abordaje retroperitoneal de adrenalectomía laparoscópica en 4 cadáveres de perro. Se diseñó una tabla de valoración con las siguientes variables: Creación de pneumoretroperitoneo (CP, tiempo en min. y dificultad 5 niveles), Instalación de puertos (IP, tiempo en min. y dificultad 5 niveles), Visualización (V, 5 niveles) and Disección (D, 5 niveles). En decúbito lateral la primoincisión de 2,5 cm se realizó lateral a los músculos epaxiales y 10 cm caudal a la última costilla. Con una disección digital se separó el espacio retroperitoneal para luego instalar el puerto único y generar el pneumoretroperitoneo. La escisión se completó con una combinación de divulsión y disección con armónico.

RESULTADOS
Tiempo medio para CP, 42.2±4.8 min y el 83% de las veces fue considerado realizable. Tiempo medio de IP fue 6.5±0.77 min y el 33% se clasificó como realizable. 54.5% de los casos la glándula se observó completamente y el 63.3% de las veces D fue considerado difícil o realizable.

CONCLUSIÓN
A pesar de la evidencia favorable en humanos, este abordaje es aparentemente más desafiante. Sin embargo, en tejidos vivos puede ser una alternativa al abordaje transperitoneal.

Figura solo de ser indispensable · Leyenda figura